

Vitamins Supplement

Composition

Nurowel tablet: Each film coated tablet contains Thiamine Mononitrate (Vitamin B₁) BP 100 mg, Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B₆) BP 200 mg & Cyanocobalamin (Vitamin B₁₂) BP 200 mcg.

Description

Nurowel (Vitamin B₁, B₆ & B₁₂) is a combination of Vitamin B₁ (Thiamine), B₆ (Pyridoxine) & B₁₂ (Cyanocobalamin). These vitamins play an essential role as co-enzyme for the metabolism of nervous system. Thus this combination normalizes the nerve cell metabolism. **Nurowel** (Vitamin B₁, B₆ & B₁₂) supports the regeneration of nerve fibers and myelin sheath by activation of the metabolism and the natural repair mechanism.

Indication

Nurowel (Vitamin B₁, B₆ & B₁₂) is indicated where a deficiency of the relevant vitamins exists. This is also indicated in neurological disorders such as poly neuropathies, neuralgia, lumbago, sciatica, facial neuralgia etc.

Dosage and administration

1-3 tablets per day or as directed by the physician.

Contraindication

Vitamin B₁, B₆ & B₁₂ should not be used in patients on Levodopa therapy and hypersensitivity to any of the active ingredients.

Adverse effect

Vitamin B₁, B₆ & B₁₂ are generally well tolerated. In rare cases hypersensitive reaction has been reported and sensitivity disturbance may occur.

Use in special group

No risks have become known associated with the use of Vitamin B₆ & Vitamin B₁₂ during pregnancy at the

recommended dose. It is not known whether Thiamine (Vitamin B₁) is excreted in breast milk or not, but may be taken cautiously during lactation. Vitamin B₆ & Vitamin B₁₂ have no adverse effect during lactation.

Precaution

Caution should be taken in patients with renal impairment, sarcoidosis, hypercalcemia and hypercalciuria, cardiac disease.

Drug interaction

Neomycin, Chloramphenicol, Aminosaliclic acid & Histamine (H₂) receptor antagonist may reduce Vitamin B₁₂ absorption.

Storage

Keep out of the reach of children. **Keep below 30° C, protect from light.**

How supplied

Nurowel tablet: Each box contains 6x10's tablet in blister pack.



SMC

Manufactured for

SMC ENTERPRISE LTD, Zamirdia, Bhaluka, Mymensingh
by **Julphar Bangladesh Ltd.**, Faridpur, Sreepur, Gazipur

উপাদান

নিউরোগয়েল ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে থায়ামিন মনোনাইট্রেট (ভিটামিন বি_১) বিপি ১০০ মি. গ্রা., পাইরিডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড (ভিটামিন বি_৬) বিপি ২০০ মি. গ্রা. এবং সায়ানোকোবালামিন (ভিটামিন বি_{১২}) বিপি ২০০ মাইক্রো গ্রাম।

বর্ণনা

নিউরোগয়েল (বি_১, বি_৬ এবং বি_{১২}) ভিটামিন বি_১ (থায়ামিন), ভিটামিন বি_৬ (পাইরিডক্সিন) এবং ভিটামিন বি_{১২} (সায়ানোকোবালামিন) এর সমন্বয়ে গঠিত। এই সব ভিটামিন স্নায়ুতন্ত্রের বিপাকে কো-এনজাইম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য এই সব ভিটামিন স্নায়ুকোষের বিপাককে স্বাভাবিক করে। নিউরোগয়েল (বি_১, বি_৬ এবং বি_{১২}) বিপাক ও প্রাকৃতিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করার মাধ্যমেও নার্ভ ফাইবার ও মাইলিন সিথ পুনর্গঠন করে।

নির্দেশনা

নিউরোগয়েল (বি_১, বি_৬ এবং বি_{১২}) বিভিন্ন ভিটামিন অভাবজনিত রোগে নির্দেশিত। এছাড়াও এটি নিউরোলজিক্যাল রোগ যেমন: নিউরোপ্যাথী, নিউরালজিয়া, লামাগো, সায়টিকা, ফেসিয়াল নিউরালজিয়ায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি

দৈনিক ১-৩ টি ট্যাবলেট অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

প্রতিনির্দেশনা

যে সকল রোগী লিবোডোপা নিচ্ছে সে সকল রোগীদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয় এবং এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীর জন্য ভিটামিন বি_১, বি_৬ এবং বি_{১২} প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

সাধারণত ভিটামিন বি_১, বি_৬ এবং বি_{১২} সুসহনীয়। অতিসংবেদনশীল বিক্রিয়া খুব কম ক্ষেত্রে হয় এবং সংবেদনশীলতার উপদ্রব হতে পারে।

বিশেষ গ্রুপের ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় অনুমোদিত মাত্রা বি_৬ ও বি_{১২} ব্যবহারে কোন প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। থায়ামিন বৃক্কের দুর্বে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি কিন্তু মাতৃদুগ্ধদানকালে সর্ভকর্তার সাথে গ্রহণ করা উচিত। দুগ্ধদানকালীন মায়েদের ক্ষেত্রে বি_৬ ও বি_{১২} ব্যবহারে কোন প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সতর্কতা

কিডনির জটিলতায় আক্রান্ত, সারকোইডোসিস, হাইপারক্যালসেমিয়া এবং হাইপারক্যালসিইউরিয়া, কার্ডিয়াক রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে গ্রহণ করা উচিত।

অন্য গুণুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

নিওমাইসিন, ক্লোরামফেনিকল, এমাইনোস্যালিসাইলিক এসিড এবং হিস্টামিন এইচ-২ রিসেপ্টর এন্টাগনিষ্ট ভিটামিন বি_{১২} এর শোষণ কমিয়ে দিতে পারে।

সংরক্ষণ

শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে, ৩০° সে. তাপমাত্রার নিচে রাখুন।

সরবরাহ

নিউরোগয়েল ট্যাবলেট: প্রতি ব্যাগে আছে ৬x১০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।



SMC

এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লি., জামিরদিয়া, ভানুকা, ময়মনসিংহ এর জন্য
জুলফার বাংলাদেশ লি., ফরিদপুর, শ্রীপুর, গাজীপুর কর্তৃক প্রস্তুত।